

使用に際して、この文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

かゆみ・しっしん・虫さされ **ラリヤ**

第2類医薬品

## 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感 刺激感、熱感、ヒリヒリ感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能又は効果

かゆみ、虫さされ、じんましん、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、しもやけ

## 用法及び用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

(用法・容量に関連する注意)

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。
- 本剤を塗布する時強くこすらないで下さい。薬の皮膜がよれて、はがれ落ちることがあります。

## 成分及び分量

100g中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	はたらき
クロタミトン	5g	かゆみを静める作用があります。
ジブカイン塩酸塩	0.3g	局所麻酔の作用でかゆみを静めます。
ジフェンヒドラミン	1g	抗ヒスタミン剤で皮膚疾患に伴う痒痒に効果があります。
l-メントール	4g	清涼感があり、鎮痛、制痒作用があります。
d-1-カンフル	3g	清涼感があり、消炎、静痒作用があります。

添加物として、エタノール、イソプロパノール、プロピレングリコール、BHT、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマーを含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06-6352-2381

受付時間 : 9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

発売元            ゼネル薬品工業株式会社    大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元    ゼネル薬工伊都株式会社    和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1