

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

イスロ[®]錠

第3類医薬品

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

用法及び用量

下記の量を1日3回食後服用して下さい。

（用法・用量に関連する注意）

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法・用量を厳守して下さい。

年 齢	1回量
15歳以上	6錠
11歳以上 15歳未満	4錠
8歳以上 11歳未満	3錠
5歳以上 8歳未満	2錠
5歳未満	服用しないこと

成分及び分量

6錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	はたらき
胆汁末	130mg	胃腸のはたらきをよくします。
デヒドロコール酸	60mg	胆汁の分泌を促進し消化を助けたり、胃腸の不快な症状を改善します。
センブリ末	15mg	苦味健胃薬として使用される生薬です。

添加物として、乳糖、バレイショデンプン、ケイ酸A1、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、L-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

（ビン入り）

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

（分包品）

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 1シート(6錠)を分割して服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、なるべく2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06-6352-2381

受付時間 : 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1