ZENEL

肩のこり

腰の痛み

関節痛

ビタミンE配合

穴あき はり薬

タミトールパス

E判

7.4 cm × 5.2 cm



販売名: タミトールパスN1 消炎鎮痛薬

第3類医薬品

- /! 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人.

- 2.次の部位には使用しないこと
 - (1)目の周囲、粘膜等.
 - (2)湿疹, かぶれ, 傷口.

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、 この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位		症	状	
皮	膚	発疹·発赤, /	かゆみ, 痛	17

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こり, 関節痛, 筋肉痛, 筋肉疲労, しもやけ, 骨折痛

用法及び用量

1日1~2回, ライナーをはがし, 患部に貼ってください.

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください.
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください.
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください、
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に1~2cm角の小片を目安とし て半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから 使用してください.
- (6)皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください.

成分及び分量 1.0mm中

1.80g *l*-メントール 4.50g dl-カンフル 9.00g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 0.50g サリチル酸メチル 1.20g ノニル酸ワニリルアミド ハッカ油

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カル シウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエ チレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します、

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください.
- ②小児の手の届かない所に保管してください.
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.).
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください.
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください.

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話:076-479-1313 受付時間 9:00~17:00(土,日,祝日を除く)

世本儿薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173

1枚(7.4cm×5.2cm)