

効能又は効果

○滋養強壮 ○虚弱体质 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

成分及び分量 (30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ浸出液3mL、淫羊藿浸出液1mL、チクセツニンジン浸出液1mL、L-リジン塩酸塩300mg、L-トレオニン15mg、グルクロノラクトン100mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム50mg、グルコン酸カルシウム水和物50mg、チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)3.2mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)5mg、ニコチニ酸アミド(ナイアシン)20mg、オルニチン酸60mg、バントテン酸ナトリウム30mg、イノシトール60mg(アルコール 0.9mL以下)
添加物として、白糖、D-ソルベitol、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

ゼネル 薬工伊都株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

ZENEL

ノンカフェイン製剤

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

発売元

ゼネル 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号



使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
- (5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
- (6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈殿を生じることがあります、薬効には変わりありません