

使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

エルキス®N

第2類医薬品

## 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能又は効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

## 用法及び用量

- 1日数回適量を患部に塗布する。
  - 用法・容量を厳守すること。
  - 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
  - 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
  - 外用にのみ使用すること。

## 成分及び分量

100g中に次の成分を含んでいます。

成分	分量
リドカイン	0.5g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
ジフェンヒドラミン	1g
酸化亜鉛	5g

添加物としてステアリン酸、セタノール、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、グリセリン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、1-メントールを含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

## お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06-6352-2381

受付時間 : 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地