

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

生薬製剤

クラシエヨクイニンタブレット

特 徴

- 「ヨクイニン」は、ハトムギの皮を除いた種（たね）で、昔からお肌のために用いられてきた生薬です。
- いぼや皮膚のあれにすぐれた効果があります。
- のみやすい小型錠です。

⚠使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
＊(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

	関係部位	症 状
＊	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
	消 化 器	胃部不快感

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

いぼ、皮膚のあれ



いぼ



皮膚のあれ

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	6錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満4才以上	3錠	
4才未満3才以上	2錠	
3才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

(裏面につづきます)

成 分

成人1日の服用量18錠（1錠120mg）中、次の成分を含んでいます。
ヨクイニンエキス……………1,500mg
（ヨクイニン19.5gに相当）
添加物として、アメ、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸
Mg、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（ヨクイニン）のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られる場合がありますが、これはヨクイニンのエキスによるものです。

*なお、本剤はヨクイニンのエキスをを用いていますので、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



健康アドバイス

●便秘に 気をつけて



便秘はお肌にとって大敵です。バランスのとれた食事を心がけ、特に温野菜や豆類、根菜類など食物繊維を多く含んだ食品をとりましょう。

●規則正しい生活を



睡眠不足や疲労、ストレス、偏った食事などは、皮膚の健康のためによくありません。睡眠を十分にとって、規則正しい生活を心がけましょう。

●プールの後は 清潔に



いぼは、プールなどでうつることが多いといわれています。プールに入った後は手足の指の間までよく洗って、汗や汚れを落としましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）