



# sato

## セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

### 第1類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

アレルギー性鼻炎用内服薬

## ストナリニガード

メキタジン配合

- くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を緩和するメキタジンを配合したアレルギー性鼻炎用内服薬です。



### 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
緑内障
  - 15歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のアレルギー用薬(皮ふ疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 高齢者。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の医薬品を服用している人。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹痛、胃部不快感、胃痛
精神神経系	頭痛、めまい、ふらふら感、倦怠感、興奮
そ の 他	排尿困難、顔面のほてり、動悸、息苦しさ、味覚異常、月経異常、口内しびれ感、むくみ、のどの痛み、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

(2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

口のかわき、下痢、便秘、眠気

## 〔効 能〕

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：

くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり

## 〔用法・用量〕

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	2回(朝・夕)
15歳未満	服用しないでください。	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTP シートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 〔成分・分量と働き〕2錠中

成 分	分 量	働 き
メキタジン	6mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。

添加物として、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、CMC-Na、ステアリン酸Mgを含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号