

この添付文書は服用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

## 鼻炎用内服薬

# 飲むダントン鼻炎薬

第②類医薬品

## 飲むダントン鼻炎薬の特長

- (1)本剤は、ウイルスなどによって起こる急性鼻炎だけでなく、花粉やハウスダストなどによって起こるアレルギー性鼻炎による鼻みず、鼻づまり、なみだ目、くしゃみ等の不快な鼻炎症状を改善するお薬です。
- (2)ベラドンナ総アルカロイドが鼻みずや涙が過剰に出るのを抑えます。
- (3)プロソイドエフェドリン塩酸塩が鼻粘膜の充血や腫れを抑え、鼻づまりを改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2)次の症状のある人

前立腺肥大による排尿困難

(3)次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

#### 4. 長期連用しないでください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)授乳中の人

(4)高齢者

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人

(7)次の症状のある人

高熱、排尿困難

(8)次の診断を受けた人

緑内障、腎臓病

(9)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性 膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

#### 【用法・用量】

次の量を添付の目盛付き計量カップではかり、1日3～6回服用してください。ただし、服用間隔は約4時間おいてください。

年齢	1回量
15歳以上	10mL
11歳以上15歳未満	6mL
7歳以上11歳未満	5mL
3歳以上 7歳未満	3mL
3歳未満	服用しないこと

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】

60mL(1日最大服用量)中

成 分	分 量	主なはたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。
プロソイドエフェドリン塩酸塩	120mg	鼻粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.18mg	鼻みずや涙が過剰に出るのを抑えます。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に作用して、頭が重い症状をやわらげます。

添加物として還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、安息香酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)服用後は瓶の口をよく拭き、フタをしっかりとしめてください。しめ方が悪いと内容液が流れ出たり汚染することがあります。
- (5)計量カップは、服用後よく水洗いし、本剤とともに清潔に保管してください。
- (6)一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### 【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ダンヘルスケア株式会社 お客様相談室

TEL 06-6441-0547

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発 売 元 **ダンヘルスケア株式会社**  
大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119