

服用に際して、次の文書を必ずお読み下さい。

ドリンク剤

アプタス®Z

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人は1日1回、1回1瓶（50mL）を服用して下さい。

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

成分及び分量（1本（50mL）中）

エゾウコギエキス	30mg	(原生薬換算量546mg)
イカリソウエキス-A	50mg	(原生薬換算量500mg)
黄精流エキス-N	0.3mL	(原生薬換算量300mg)
蛇床子乾燥エキス	60mg	(原生薬換算量300mg)
反鼻流エキス	0.1mL	(原生薬換算量100mg)
セイヨウサンザシエキス	15mg	(原生薬換算量105mg)
チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB ₁ ）	10mg	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	5mg	
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	10mg	
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	10mg	
無水カフェイン	50mg	
アルコール	0.7mL以下	

添加物として白糖、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコールを含有する。

*本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂によるもので心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381までお願い致します。

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地