

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

# ゼネル50内服液

第3類医薬品

## 使用上の注意

### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
〔関係部位〕 皮膚  
〔症 状〕 発疹・発赤、かゆみ  
〔関係部位〕 消化器  
〔症 状〕 胃部不快感
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能又は効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 用法及び用量

- 成人（15歳以上）は1日1回、1回1アンプル（50mL）を服用して下さい
- \*内服にのみ使用して下さい
  - \*用法・用量をお守り下さい
  - \*胃腸の弱い方は食後に服用して下さい
  - \*アンプルはキャップのまま、首の白線のところより折って服用して下さい

## 成分及び分量 1アンプル（50mL）中

成分	分量
長岡の人参エキス	(原生薬ニンジン125mg相当) 50mg
反鼻チンキ	(原生薬反鼻6mg相当) 30mg
ゴオウチンキ	(原生薬ゴオウ0.2mg相当) 20mg
チアミン硝化物 (V. B1)	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム (V. B2)	2mg
ピリドキシン塩酸塩 (V. B6)	5mg
シアノコバラミン (V. B12)	20μg
酢酸d1-α-トコフェロール (V. E)	5mg
タウリン	1000mg
イノシトール	100mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	250mg
パンテノール	5mg
チオクト酸アミド (α-リポ酸)	5mg
カフェイン水和物	50mg
アルコール	0.4mL以下

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、d1-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、ポリソルベート80、プロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリンを含有します

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい

## お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1