

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンE剤

## フレンドール®

第3類医薬品

### 使用上の注意

#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。  
出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 効能又は効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え、しもやけ。

更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ。

月経不順 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても 改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」

次の場合のビタミンEの補給：老年期

### 用法及び用量

下記の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	1～3回
15歳未満	服用しないこと	

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用して下さい。

（用法・用量に関する注意）

\*用法・用量をお守り下さい。

### 成分及び分量

1カプセル中

成分	分量
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	100mg

添加物として小麦胚芽油、ゼラチン、グリセリン、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1