

使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

皮膚疾患治療薬
吉草酸酢酸プレドニゾロン配合

指定第2類医薬品

リナαクリーム

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないで下さい。
 - 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - 創傷面、目の周囲、粘膜等
- 顔面には広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないで下さい。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、

用法及び用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

○塗布部をお肌当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗って下さい。

◇用法・用量に関連する注意◇

- 定められた用法・用量をお守り下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。

成分及び分量

1 g中に次の成分を含んでいます。

成分	1 g中	はたらき
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5 mg	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を抑えます。
クロタミトン	50 mg	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1 mg	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、ステアリルアルコール・セタノール・トリエタノールアミン・パラベン・プロピレングリコール・ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油・ポリソルベート60・カルボキシビニルポリマー・セバシン酸ジエチルを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

お問い合わせ先

製造販売元：万協製薬株式会社

電話番号：0598-37-2088

受付時間：AM10:00～PM5:00 (ただし、土、日、祝日を除きます。)

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142