

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬
熊膽圓S

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔、悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

用法及び用量

次の量を食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1個	3回
11歳以上15歳未満	2/3個	3回
11歳未満	服用しないこと	

(用法・用量に関する注意)

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 熊膽圓Sの取り出し方
熊膽圓Sの入っているアルミ箔(バイナライト)を指先で裂き、取り出してください。

成分及び分量

1日量（3個）中

成分 (原生薬)	分量 (原生薬換算量)
オウレンエキス (オウレン)	11.2mg (70mgに相当)
オウバクエキス (オウバク)	49.4mg (380mgに相当)
センブリエキス (センブリ)	14mg (70mgに相当)
ゲンチアナエキス (ゲンチアナ)	62mg (200mgに相当)
ダイオウエキス (ダイオウ)	40mg (200mgに相当)
ウコンエキス (ウコン)	28mg (350mgに相当)
アロエ	150mg
動物胆 (牛胆)	50mg
アカメガシワエキス (アカメガシワ)	275mg (2500mgに相当)

添加物として、デキストリン、タルクを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

製造販売元 : 株式会社 廣貫堂
電話番号 : 076-424-2259
受付時間 : 9時から17時まで (土、日、祝祭日を除く)

発売元 ゼネラル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 株式会社 廣貫堂 富山市梅沢町2丁目9-1