

ご使用に際して、この文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目の疲れ・目のかすみ・充血

マイビーアイクリア α

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人：緑内障

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
目	充血・かゆみ・はれ

(次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状が良くならない場合。

効能又は効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法及び用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用される場合には、保護者の指揮監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先が、まぶたやまつげなどに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 本剤は、点眼にのみ使用してください。

成分及び分量(100mL中)

塩酸テトラヒドロゾリン	50mg
ベルベリン硫酸塩水和物(黄柏由来成分)	10mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
パンテノール	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg
イプシロン-アミノカプロン酸	1500mg
グリチルリチン酸ニカリウム(甘草由来成分)	250mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
タウリン	1000mg

添加物として、エデト酸Na水和物、ホウ酸、d-ボルネオール、l-メントール、塩化Na、クロロブタノール、パラベンを含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる恐れがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。黄色い液が衣服などにつかないよう、十分注意してください。また、点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになる事をお勧めします。
- (7) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様窓口

電 話： 0942-92-5656

受付時間： 午前9：00～午後5：00(土、日、祝日を除く)

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社 〒530-0043 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元：佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481