

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

循環器系薬（強心薬）

バルタス®・A

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の強心薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

動悸、息切れ、気付

用法及び用量

下記の量を1日2回朝夕に水又は温湯にて服用して下さい。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	2粒

（用法・用量に関連する注意）

- （1）かまずに服用して下さい。
- （2）用法・用量を厳守して下さい。
- （3）15歳未満の小児は服用しないこと

成分及び分量

1日量（4粒）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量
ジャコウ	1.0mg
ゴオウ	4.0mg
センソ	5.0mg
ニンジン末	17.0mg
サフラン	3.0mg
羚羊角末	5.0mg
d-ボルネオール	2.5mg
ユウタン	3.0mg
沈香末	18.0mg

添加物としてサリチル酸、金箔、寒梅粉を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地