

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

リココデ®・バツカンエース

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、 血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

- 大人1日3回、1回1本（30mL）服用して下さい。
- 用法及び用量を厳守して下さい。
 - 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがあります。
よく振ってから服用して下さい。
 - 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂によるもので心配ありません。

成分及び分量（3本（90mL）中）

カンゾウエキス	900mg
バクモンドウ流エキス	0.6ml
タウリン	900mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	30mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	6mg
アルコール	0.5ml以下

添加物として白糖、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベンを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地