

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品

イスロ®胃腸ドリンクS

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

用法及び用量

年齢	用法及び用量
成人（15歳以上）	1回1瓶（30mL）を1日2回服用して下さい。 但し、服用間隔は4時間以上おいて下さい。

- 用法及び用量を厳守して下さい。
- 15歳未満の小児は服用しないで下さい。
- 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

成分及び分量

2本（60mL）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量
ゲンチアナ流エキス	0.6mL（原生薬換算量600mg）
ショウキョウチンキ	0.8mL（原生薬換算量160mg）
蒼朮流エキス	1mL（原生薬換算量1000mg）
人参エキス-P	30mg（原生薬換算量333mg）
延胡索乾燥エキス	60mg（原生薬換算量540mg）
カルニチン塩化物	120mg

添加物として白糖、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、安息香酸Na、パラベン、 ℓ -メントールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元：ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元：ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地