

ゼネル B₁ ファイン

第3類医薬品

服用に際して、次の説明文を必ずお読みください。

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
軟便、下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分及び分量（2カプセル中）

成分	分量
フルスルチアミン塩酸塩	100mg
リボフラビン	4mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
オキソアミジン末	50mg

添加物：バレイシヨデンブン、無水ケイ酸、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na

*本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂によるもので心配ありません。

効能又は効果

- ・次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- ・脚気「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」
- ・次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法及び用量

大人（15歳以上）は1回1～2カプセル、7歳以上15歳未満は1回1カプセルを1日1回服用する。

- （1）用法及び用量を厳守して下さい。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- （3）7歳未満の小児には服用させないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1