

ご使用前に、この添付文書を
必ずお読み下さい。
また必要な時に読めるように
大切に保管して下さい。



第1類医薬品

この薬には、男性ホルモン・麻酔剤および血液の流れを
よくする成分が、配合されており局部に塗るユニークな製品です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位以外には使用しないこと。
(1) 局部(亀頭部)以外に使用しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 今迄に薬によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、はれ等)をおこした事がある人。
 - (2) 医師の治療をうけている。
 - (3) 前立腺肥大のある方。
 - (4) 局部にきず、炎症、かゆみ、湿疹のある方。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持ち医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
亀 頭 部	発赤、はれ、刺激感

- (2) 10日間使用しても症状の改善がみられない場合

用法・用量

1日1回約0.1g(小豆粒大)を亀頭のまわり(尿道口を除く)によくすりこむように塗布する。症状が好転したら隔日にする。

効能・効果

男子更年期以降における次の諸症/男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、性感減退、陰萎、遺精、精液漏)

裏面もお読み下さい。

成分・分量

(1g中)

成分	分量	はたらき	・添加剤としてステアロールアルコール、ポリオキシエチレン、硬化ヒマシ油、メチルパラベン、プロピルパラベンを含む。
テストステロン	10.0mg	男性ホルモン	
酢酸di- α トコフェロール	10.0mg	血の流れをよくします	
アミノ安息香酸エチル	100.0mg	局部を麻ひします	
塩酸ジフェンヒドラミン	5.0mg	局部のかゆみをとります	

使用上の注意の関連事項

1. 使用に際して次の事に注意して下さい。
 - (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
 - (2) 小児には使用しないで下さい。
 - (3) 使用の際は、特に手指を清潔にして塗布して下さい。
2. 性行為の際、本品が女性性器粘膜を麻ひして性感昂揚の妨げになることがありますから、本品を塗布後20分～30分して拭きとるか、コンドームの使用をお勧めいたします。




保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 本品は、温度・時間等の関係で黄色が濃くなる場合がありますが薬効には関係ありません。
- (5) 本品は冬期固くなる事もありますが、温めてから使用して下さい。
- (6) 本品はまれに微結晶を析出することがありますが、薬効には関係ありません、そのままご使用ください。

包装 6g

容器の正しい使い方

※キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。
※使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。



お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

メイクトモロー

のホームページ

<http://www.maketmr.co.jp>

お客様相談室 平日(月～金)10:00～17:00

☎ 0120-226-028

フリーダイヤル

キクリウ製薬 株式会社 お客様相談室

〒155-0032 東京都世田谷区代沢2-20-7 電話.03-3421-0860

受付時間/月～金曜日 10:00～17:00 (祝日は除く)



紙
箱
添付文書



キャップ
「チューブはアルミです」

製品販売

医 薬 株式会社 **メイクトモロー**
〒541-0045 大阪市中央区道修町1-3-7

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元



キクリウ製薬株式会社

東京都世田谷区代沢2-20-7