

Medicine for Ringing in The Ears  
販売名:ナリピタン 当帰芍薬散錠  
漢方製剤 第2類医薬品

**特徴** 声が聞き取りづらい、集中できないなどの「耳鳴り」の症状に効く  
漢方「当帰芍薬散」が、血流改善作用・利尿作用で耳鳴りを改善

### △ 使用上の注意

**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 胃腸の弱い人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

**効能・効果** 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

**用法・用量** 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること (3) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとめること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あったらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室  
0120-5884-01  
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元  
小林製薬株式会社  
〒567-0057  
大阪府茨木市豊川1-30-3

10210269

押し下げる

耳鳴りのメカニズム

ストレス 疲労

自律神経の乱れ

血流不足とむくみが発生

聴覚細胞の機能が低下



ナリピタンは、血流改善と利尿作用で耳鳴りを改善

こんな症状が楽になるのも効き目のサイン!

めまい 立ちくらみ

肩こり 腰痛 頭重

続けてお飲みいただくことをおすすめします。

※1ヶ月くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止してください

**成分・分量** 1日量(12錠)中

当帰芍薬散エキス(1/2量) 2.30g

トウキ・センキュウ 各1.5g、シャクヤク・ブクリョウ・ソウジュツ・タクシャ 各2.0g より抽出

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する  
●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります