

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



痛くてしみる口内炎に効く!

# 口内炎軟膏大正クイックケア

第2類医薬品 〈口内炎用薬〉

- ◆口内炎軟膏大正クイックケアは、口内炎の治療を目的として開発した軟膏です。患部への密着性が良く、口腔内であっても長時間患部を覆います。
- ◆「口内炎(アフタ性)」とは…  
頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が浅くくぼんだ白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍(直径10mm未満)が1～数个できた炎症の総称です。原因は明確ではありませんが、ストレス、疲労、あるいは栄養摂取の偏りが関与するとされています。



## 使用上の注意

必ず読むこと!



### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は使用しないでください

- (1) 感染性の口内炎が疑われる人。  
(医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください)
  - ・ガーゼなどで擦ると容易に剥がすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人。(カンジダ感染症が疑われます)
  - ・患部に黄色い膿がある人。(細菌感染症が疑われます)
  - ・口腔内に米粒大～小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人。(ウイルス感染症が疑われます)
  - ・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人。(ウイルス感染症が疑われます)
- (2) 口腔内に感染を伴っている人。  
(ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの報告があることから、歯槽膿漏、歯肉炎等の口腔内感染がある部位には使用しないでください)
- (3) 5日間使用しても症状の改善がみられない人。
- (4) 1～2日間使用して症状の悪化がみられる人。



### 相談すること



- 1 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4) 授乳中の人。
  - (5) 患部が広範囲にある人。
  - (6) 高齢者。
- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口腔内	白斑(カンジダ感染症が疑われる)、患部に黄色い膿がある(細菌感染症が疑われる)
その他	アレルギー症状(気管支喘息発作、浮腫等)

- 3 本剤使用后、次の症状があらわれた場合には、感染症による口内炎や他疾患による口内炎が疑われるので使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹、水疱(口腔内以外)、発疹・発赤、かゆみ、口腔内の患部が広範囲に広がる、目の痛み、かすみ目、外陰部潰瘍




## 効 能

### 口内炎(アフタ性)

「口内炎(アフタ性)」とは…

右図のように頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が浅くくぼんだ白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍(直径10mm未満)が1～数个できた炎症の総称です。原因は明確ではありませんが、ストレス、疲労、あるいは栄養摂取の偏りが関与すると言われています。




## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は口腔用にのみ使用し、口腔用以外には使用しないでください。
- (4)入れ歯の接着など治療以外の目的に使用しないでください。
- (5)痛みが治まったら使用を終了してください。




### 〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

### 〈使用法〉




患部の水分・だ液などを軽くふき取ってください。



乾いた指先に薬剤をとり、患部に軽く押し当て、すり付けるように1回で塗布してください。(何度もすり付けしないでください)



口を閉じる前に患部に塗布した製剤の表面を舌先等で軽く湿らせてください。



水分を引き寄せた表面は、アクアセンサーバリア\*となり、患部をしっかりカバーします。

※アクアセンサーバリア(登録商標)は、表面に唾液等の水分を引き寄せることで軟膏が歯など周囲につきにくくなり、優れた付着力で患部を長時間カバーする独自技術です。

## 成 分

100g中

成 分	分量	はたらき
トリアムシノロンアセトニド	0.1g	患部の炎症を鎮め、口内炎を改善します。

添加物：キシリトール、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ゲル化炭化水素、香料、L-メントール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)