


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名: ロート抗菌目薬i 眼科用薬・0.5mL×20本入 第2類医薬品

ものもらい・結膜炎の治療に ロート抗菌目薬i

小さなお子さまにも*




ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

効き目をしっかり。 目にとどめる滞留性設計。

「ロート抗菌目薬i」は、細菌に強い抗菌力を持つサルファ剤を配合しています。そして、このサルファ剤を目の表面に長くとどめるヒプロメロースとアルギン酸の2つの粘稠剤を配合しています。さらに、抗炎症成分をW配合することで効果的に炎症を鎮めます。いつでも清潔な1回使いきりタイプで、炎症を起こした目にもやさしいさし心地です。ものもらい・結膜炎をしっかり治療したいときには「ロート抗菌目薬i」。

※1歳以上



【開け方】

キャップ部分を無理にひっぱらずに、ゆっくり回して開けてください。

●いきおいよく開封したり、強く押さえて開封すると薬液が飛び散ることがありますのでゆっくり開封してください。

使用上の注意

してはいけないこと

-  (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- *1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
- はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を

持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3～4日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[目にキズがついたり、汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



成 分

スルファメトキサゾールナトリウム4% グリチルリチン酸二カリウム0.15%

イプシロン-アミノカプロン酸1%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、アルギン酸、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリソルベート80、エデト酸Na、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本品は外箱に入れ、日光や蛍光灯の当たらない涼しい所に保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後はすみやかにご使用ください。
- (6) 本品は、「1回使いきりタイプ」の点眼剤です。容器には薬液が押し出しやすいようにやや多く入っていますが、一度開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。
- (7) ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップが開くことがありますのでご注意ください。

※点眼により口中に苦味を感じるがありますが、薬液が涙道を通して流れでくるためで、無害ですから心配ありません。

お問合せ先

コミュニケーションコール
0120-610-755

受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)

製造販売元(輸入元)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1