

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第Ⅱ類医薬品  
便秘治療薬

# ファイブアスペンタイワ

植物性センイ（ブランタゴ・オバタ種皮末）配合

ファイブアスペンタイワは、ブランタゴ・オバタ種皮末が水分を吸収し相当の量に膨らんで作用を発揮し、センナ実末は腸の運動を促進します。両者の働きにより、排便を促し腸内の宿便もきれいに取り去ります。更に、シャクヤク、カンゾウの組み合わせで腹痛を和らげる効果があります。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能又は効果】

- ・便秘
- ・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

### 【用法及び用量】

次の量を朝夕の空腹時（又は食前あるいは食間）にコップ1杯以上の水又はお湯でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	1～1.5包（1包半）	2回
小児（15歳未満）	服用しないこと	

◎用法及び用量に関連する注意

プラントゴ・オバタ種皮末は、水分を吸収し膨潤しますので、必ずコップ一杯以上の水又はお湯で服用してください。

### 【成分及び分量】

1日量（3包＝10,000mg）中

プラントゴ・オバタ種皮末 .....4,500mg  
 センナ実末 .....1,500mg  
 シャクヤク末 .....750mg  
 カンゾウ末 .....750mg  
 添加物としてバレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酸化チタン、プロピレングリコール、香料及び三二酸化鉄を含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
 （誤用の原因になったり品質が変わります。）

### 【問い合わせ先】

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25

電話 0745-22-4151

受付時間／9：00～16：00（土・日・祝日を除く）

発 売 元



**大和製薬株式会社**

富山県富山市水橋二杉1-2

製造販売元

**寧薬化学工業株式会社**

奈良県大和高田市旭南町2-25