

## 用於結膜炎、麥粒腫

第2類醫藥品

# Sante® Antibacterial New Eye Drops

含有持續性磺胺類藥物（磺胺甲基異惡唑）

眼睛發紅、有異物感、結膜分泌物過多、眼瞼邊緣及內側部分化膿發痛...

結膜炎多由細菌引起，麥粒腫為細菌侵入眼瞼的皮脂腺或睫毛根部，引起化膿性炎症的眼部疾病。

Sante Antibacterial New Eye Drops 是含有持續性磺胺類藥物（磺胺甲基異惡唑）的抗菌劑眼藥。也添加了增稠劑（羥丙甲纖維素）延長磺胺甲基異惡唑停留眼中的時間，提高其抗菌能力。更添加了對眼部瘙癢、炎症、組織代謝有效的3種成分。可用於改善結膜炎及麥粒腫。



### ⚠ 使用注意事項

#### ❌ 禁止事項

（如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用）

請勿長期連續使用。

#### 👤 諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
  - 正接受醫生治療的人
  - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
  - 有以下症狀的人  
劇烈的眼睛疼痛
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

| 關聯部位 | 症狀          |
|------|-------------|
| 皮膚   | 起疹、泛紅、瘙癢    |
| 眼睛   | 充血、瘙癢、腫脹、刺痛 |

- 使用3~4天症狀依然未改善時，請停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

### 用法、用量

一次1~2滴、一日點眼3~5次。

#### ●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請勿在佩戴著軟式隱形眼鏡時使用。
- 請只用於點眼。



### 適應症

結膜炎（流行性角結膜炎）、麥粒腫、眼瞼炎（眼瞼接觸性皮炎）、眼部瘙癢

有關「麥粒腫」的注意事項：請勿揉搓眼瞼或以其他方式給予眼睛刺激。（另外，某些情形下麥粒腫易由體質因素引起，容易在疲勞過度及睡眠不足等體力下降的時候發生，請避免疲勞並保持充足睡眠。）

### 成分、含量

| 成分                | 含量    | 作用                             |
|-------------------|-------|--------------------------------|
| 磺胺甲基異惡唑<br>（抗菌成分） | 4.0%  | 用長效性磺胺劑，展現出對抗導致結膜炎及麥粒腫病菌的抗菌作用。 |
| 撲爾敏               | 0.03% | 抑制組胺的作用，緩解充血、瘙癢。               |
| 甘草酸二鉀             | 0.25% | 抑制眼部炎症。                        |
| 牛磺酸               | 0.5%  | 活化眼睛組織的代謝。                     |


作為添加物，含有依地酸鈉水合物、羥丙甲纖維素、羥基羧苯胺、Ph值調節劑。

#### 〈成分、容量相關的注意事項〉

本劑於點藥後，偶爾會有在嘴裡感覺到甜味的情況。這是由主成分的磺胺甲基異惡唑以及甘草酸二鉀透過淚腺進入嘴裡而導致，並非因品質等方面的異常所引起。

### 保管及操作注意事項

- 請控緊後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。  
（會導致誤用或造成品質的改變。）
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。開封後，即使尚在使用期限內，亦請盡快使用。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。



包裝 12mL

### 諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-023 受理時間 9:00~17:00（週末、例假日除外）

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。