

人工淚液型點眼劑 Soft Santear®

第3類醫藥品

Soft Santear 是擁有與淚液相似的人工淚液，可改善因淚液不足帶來的眼部乾澀（乾眼症）及異物感等不適症狀。

除此以外，Soft Santear 已證實不會對隱形眼鏡造成任何影響，所以可以戴著所有類型的隱形眼鏡 [軟、O₂、硬、一次性（拋棄）] 點眼藥。被診斷為乾眼症的人等，建議您定期接受眼科診治。



⚠ 使用注意事項

諮詢事項

- 以下人員請在使用前諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 正接受醫生治療的人
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人
 - 有以下症狀的人
劇烈的眼睛疼痛
 - 曾接受以下診斷的人
青光眼
- 使用後出現以下症狀時可能是副作用，請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹、泛紅、瘙癢
眼睛	充血、瘙癢、腫脹

- 以下情形請立即停止使用，並攜帶本書，諮詢醫生、藥劑師或合格銷售者。
 - 視線模糊未改善時
 - 使用約2星期症狀依然未改善時

用法、用量

一次2~3滴、一日點眼5~6次。

●請遵守以下注意事項。

- 讓小孩使用時，請在保護者的指導監督下使用。
- 容器尖端請勿碰觸到眼睛、眼瞼或睫毛（因為可能混入了眼屎或雜菌，會污染藥液或使藥液混濁）。另外，請勿使用混濁的藥劑。
- 請只用於點眼。

開蓋方式



適應症

佩戴硬性或軟式隱形眼鏡時的不適感、補充淚液（眼部乾澀）、眼疲勞、視線模糊（結膜分泌物過多時等）

成分、含量

成分	含量
氯化鉀	0.1%
氯化鈉	0.4%

作為添加物，含有硼酸、Ph值調節劑。

藥劑的特性

pH	7.0~8.0
滲透壓比	0.90~1.20
特性	透明無色、無菌的水性點眼劑

保管及操作注意事項

- 使用前請勿扭轉瓶蓋。
- 請拧紧後保管在不會直接照射到陽光的陰涼場所。為保持產品品質，請勿放置在汽車內或接近暖氣設備等高溫場所。另外，放置於高溫場所後，會有容器變形、藥液漏出、藥液品質劣化等疑慮，請勿使用。
- 請保管在幼小孩童拿不到的地方。
- 請勿換裝到另一個容器。
(會導致誤用或造成品質的改變。)
- 請勿與他人共用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。另外，開封後，即使尚在使用期限內，亦請勿使用已開封超過約10天的剩餘藥液。
- 依保存狀態的不同，在容器的點藥口周圍或瓶蓋內側會有白色的成分物結晶。此種情況下，請用清潔的紗布輕輕擦拭後使用。

包裝 5mL×4瓶

諮詢窗口

有關商品內容的詢問，請向購買的店家或向下列窗口提出。

參天製藥株式會社「顧客諮詢室」電話號碼 0120-127-02 受理時間 9:00~17:00 (週末、例假日除外)

為保證詢問內容的正確性，也為維持、提升回答的品質，將會對電話進行錄音。