

名称 ZENOL Xum SX																					
<p>特征</p> <p>日本第2类医药品</p> <p>●外用镇痛消炎药</p> <p>联苯乙酸渗入患部，缓解关节、肌肉、肩膀疼痛。</p> <p>速涂型硬凝胶剂，易涂不脏手。</p> <p>不黏腻，涂完即可穿衣服。</p> <p>采用新型设计容器，使用方便。</p>																					
<p>成分、含量</p> <p>100g本品中</p> <table border="1" data-bbox="194 676 651 788"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>含量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>联苯乙酸</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>1-薄荷醇</td> <td>3.0g</td> </tr> </tbody> </table> <p>添加物含异丙醇、丙二醇、聚乙二醇、聚氧乙烯氢化蓖麻油、硬脂酸钠、1, 3-丁二醇、油醇、角鲨烷、pH调整剂。</p>	成分	含量	联苯乙酸	3.0g	1-薄荷醇	3.0g	<p>详细信息</p> <table border="1" data-bbox="884 645 1490 900"> <tbody> <tr> <td>销售商</td> <td>大鹏药品工业株式会社</td> </tr> <tr> <td>制造销售商</td> <td>三笠制药株式会社</td> </tr> <tr> <td>剂型</td> <td>硬凝胶剂</td> </tr> <tr> <td>包装单位</td> <td>43g×1盒</td> </tr> <tr> <td>厂商建议零售价</td> <td>1500日元</td> </tr> <tr> <td>JAN编码</td> <td>4987117372014</td> </tr> <tr> <td>使用期限</td> <td>3年</td> </tr> </tbody> </table> <p>用法、用量</p> <p>1日2~4次，将适量本品擦拭在患部。</p> <p>[用法、用量相关注意事项]</p> <p>(1) 请严格遵守用法、用量。</p> <p>(2) 请注意不要进入眼睛。若不慎进入眼睛，请立即用水或温水冲洗。症状严重时，请接受眼科医生的诊治。</p> <p>(3) 本药剂仅限外用，请勿内服。</p> <p>(4) 将本药剂擦拭在患部后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品覆盖。</p> <p>(5) 请将患部的汗擦干后使用。</p> <p>(6) 请勿将容器直接接触患部，请从容器中将药剂挤出4~5mm后使用。</p> <p>(7) 当药剂底部的底托露出，托盘的上方暴露在外时，请停止使用本药剂。底托上残留的药剂请勿继续使用。</p>	销售商	大鹏药品工业株式会社	制造销售商	三笠制药株式会社	剂型	硬凝胶剂	包装单位	43g×1盒	厂商建议零售价	1500日元	JAN编码	4987117372014	使用期限	3年
成分	含量																				
联苯乙酸	3.0g																				
1-薄荷醇	3.0g																				
销售商	大鹏药品工业株式会社																				
制造销售商	三笠制药株式会社																				
剂型	硬凝胶剂																				
包装单位	43g×1盒																				
厂商建议零售价	1500日元																				
JAN编码	4987117372014																				
使用期限	3年																				
<p>功能、效果</p> <p>关节痛、肌肉痛、肩周炎伴有的肩膀疼痛、腰痛、跌打伤、扭伤、腱鞘炎（手、手腕、脚腕的疼痛和肿胀）、肘部疼痛（网球肘等）</p>																					
<p>使用时的注意事项</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 禁止事项</p> <p>(若不遵守，现有症状将会恶化或容易产生副作用。)</p> <p>1. 以下人群请勿使用。</p> <p>(1) 曾因本药剂或本药剂的成分引发过过敏症状的人</p> <p>(2) 曾发过哮喘的人</p> <p>(3) 孕妇或可能已经怀孕的人</p> <p>(4) 不满15岁的儿童</p> <p>2. 请勿使用在以下部位。</p> <p>(1) 眼睛周围、粘膜等</p> <p>(2) 湿疹、皮疹、伤口</p> <p>(3) 脚癣、癣菌病等或已经化脓的患部</p> <p><input type="checkbox"/> 咨询事项</p> <p>1. 以下人群在使用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。</p> <p>(1) 正接受医师治疗的人</p> <p>(2) 曾因药物等引发过过敏症状的人</p> <p>2. 使用后，若出现以下症状，有可能是副作用，故请立即停止使用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。</p>																					
<table border="1" data-bbox="194 1733 1187 1809"> <thead> <tr> <th>相关部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮肤</td> <td>出疹子或发红、瘙痒、肿胀、刺痛感、皮疹</td> </tr> </tbody> </table>	相关部位	症状	皮肤	出疹子或发红、瘙痒、肿胀、刺痛感、皮疹																	
相关部位	症状																				
皮肤	出疹子或发红、瘙痒、肿胀、刺痛感、皮疹																				
<p>偶尔会出现以下严重症状。届时请立即接受医师诊治。</p> <table border="1" data-bbox="194 1881 1519 1975"> <thead> <tr> <th>症状名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>休克（过敏性反应）</td> <td>使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识混乱等症状。</td> </tr> </tbody> </table>		症状名称	症状	休克（过敏性反应）	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识混乱等症状。																
症状名称	症状																				
休克（过敏性反应）	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识混乱等症状。																				
<p>3. 若在使用约1周后症状仍未见好转，请停止使用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。</p>																					