

名稱 Zenol Xum SX

特徵

第2類醫藥品

●外用鎮痛消炎藥

聯苯乙酸能滲透患部，消除關節、肌肉、肩部的疼痛。

可直接塗抹的膏狀固體藥劑，容易塗布且不沾手。

不黏膩的質地，塗抹後可立刻穿上衣服。

容器採用易於使用的全新設計。



成分／份量

100g 中所含

成分	含量
聯苯乙酸	3.0g
l-薄荷醇	3.0g

添加物含有異丙醇、丙二醇、聚乙二醇、聚乙烯硬花萆麻油、硬脂酸鈉、1,3-丁二醇、油醇、角鯊烯、pH調整劑。

詳細資訊

經銷商	大鵬藥品工業股份有限公司
製造經銷商	三笠製藥股份有限公司
劑型	膏狀製劑
包裝單位	43g×1盒
廠商建議零售價格	1500日圓
JAN代碼	4987117372014
使用期限	3年

效能／效果

關節痛、肌肉痛、肩膀僵硬伴隨的肩膀疼痛、腰痛、挫傷、扭傷、肌腱炎(手部、手臂、腳踝疼痛與腫脹)、手肘痛(網球肘等)

用法與用量

1天使用2~4次，適量塗抹於患部。

[用法／用量相關注意事項]

- (1)請嚴格遵守用法與用量。
- (2)請注意避免誤入眼睛。萬一誤入眼睛時，請立刻以水或溫水清洗。症狀嚴重時，請接受眼科醫師診治。
- (3)本藥劑只能作為外用，請勿內服。
- (4)塗抹本劑後的患部，請勿以保鮮膜等透氣性不佳的物品覆蓋。
- (5)請先擦乾患部的汗水後再使用。
- (6)為了避免容器直接碰到患部，請先將容器內的藥劑推出4~5mm後再使用。
- (7)已能看到藥劑底盤、底盤上層露出時，請勿再使用本劑。請勿勉強使用底盤上殘留的藥劑。

使用注意事項

☒ 禁止事項

(若不遵守將會使目前症狀惡化，容易引發副作用。)

1.有以下情形者請勿使用。

- (1)曾因本藥劑或本藥劑的成分產生過敏症狀者
- (2)曾發生氣喘症狀者
- (3)孕婦或可能懷孕者
- (4)未滿15歲的兒童

2.請勿使用於以下部位。

- (1)眼睛周圍、黏膜等
- (2)溼疹、皮膚乾燥部位、傷口
- (3)香港腳、頑癬等或化膿的患部

☒ 諮詢事項

1.有以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

- (1)正在接受醫師治療者
  - (2)曾因藥物等產生過敏症狀者
- 2.使用後出現以下症狀時，可能是產生副作用，請立刻停止使用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	起疹／發紅、發癢、腫脹、刺痛感、皮膚乾燥

可能偶爾會出現以下嚴重症狀。此時請立刻接受醫師診治。

症狀名稱	症狀
休克(全身過敏性反應)	使用後立刻出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識不清等症狀。

3.使用1週後症狀仍未改善時，請停止使用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。