


명칭 제놀 역삼 SX																					
<b>특징</b> 일반의약품 ●외용 진통소염약 펠비낙이 환부에 침투하여 관절과 근육, 어깨의 통증을 완화합니다. 직접 바르는 스틱 타입이므로 바르기 쉽고 손에 묻지 않습니다. 끈적거리지 않으므로 바로 옷을 입을 수 있습니다. 사용하기 쉽도록 새로 설계된 용기를 사용하고 있습니다.																					
<b>성분 및 분량</b> 100g 중 <table border="1" data-bbox="178 616 598 712"> <thead> <tr> <th>성분</th> <th>함량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>펠비낙</td> <td>3.0g</td> </tr> <tr> <td>l-멘톨</td> <td>3.0g</td> </tr> </tbody> </table>	성분	함량	펠비낙	3.0g	l-멘톨	3.0g	<b>상세 정보</b> <table border="1" data-bbox="810 577 1364 810"> <tr> <td>판매원</td> <td>다이호 약품공업 주식회사</td> </tr> <tr> <td>제조 판매원</td> <td>미카사 제약 주식회사</td> </tr> <tr> <td>제형</td> <td>스틱제</td> </tr> <tr> <td>포장 단위</td> <td>43gx1상자</td> </tr> <tr> <td>희망소비자가격</td> <td>1500엔</td> </tr> <tr> <td>JAN 코드</td> <td>4987117372014</td> </tr> <tr> <td>사용 기한</td> <td>3년</td> </tr> </table>	판매원	다이호 약품공업 주식회사	제조 판매원	미카사 제약 주식회사	제형	스틱제	포장 단위	43gx1상자	희망소비자가격	1500엔	JAN 코드	4987117372014	사용 기한	3년
성분	함량																				
펠비낙	3.0g																				
l-멘톨	3.0g																				
판매원	다이호 약품공업 주식회사																				
제조 판매원	미카사 제약 주식회사																				
제형	스틱제																				
포장 단위	43gx1상자																				
희망소비자가격	1500엔																				
JAN 코드	4987117372014																				
사용 기한	3년																				
<b>효과 및 효능</b> 관절통, 근육통, 어깨 결림에 따른 어깨의 통증, 요통, 타박, 염좌, 건초염 (힘줄윤활막염), 팔꿈치의 통증(테니스 엘보 등)	<b>용법 및 용량</b> 1일 2~4회 적당량을 환부에 바르십시오. [용법 및 용량에 관한 주의사항] (1) 용법과 용량을 반드시 지켜 주십시오. (2) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오. (3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오. (4) 이 약을 바른 후, 환부를 랩 등과 같이 통기성이 나쁜 것으로 덮지 마십시오. (5) 환부의 땀을 닦아낸 후에 사용하십시오. (6) 용기가 직접 환부에 닿지 않도록 용기 안의 약제를 4~5mm 꺼낸 후에 사용하십시오. (7) 약제 밑 부분의 발침대가 보이고, 그 발침대의 윗면이 보이게 되면 사용을 중단하십시오. 또한, 발침대에 남은 약제를 무리하게 사용하지 마십시오.																				
<b>사용상의 주의사항</b> <b>금기</b> (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다.) 1. 다음과 같은 사람은 사용하지 마십시오. (1) 이 약 또는 이 약의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (2) 천식을 앓은 적이 있는 사람. (3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람. (4) 15세 미만의 소아 2. 다음 부위에는 사용하지 마십시오. (1) 눈 주변, 접막 등 (2) 습진, 짓무름, 상처 (3) 무좀, 백선 등 또는 화농성 환부 <b>신중투여</b> 1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오. (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람 (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람 2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오. <table border="1" data-bbox="178 1803 1088 1870"> <thead> <tr> <th>관련 부위</th> <th>증상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>피부</td> <td>발진·발적, 가려움증, 부종, 따끔거림, 짓무름</td> </tr> </tbody> </table>		관련 부위	증상	피부	발진·발적, 가려움증, 부종, 따끔거림, 짓무름																
관련 부위	증상																				
피부	발진·발적, 가려움증, 부종, 따끔거림, 짓무름																				
간혹 아래와 같은 심각한 증상을 일으키는 경우가 있습니다. 그러한 경우는 즉시 의사의 진료를 받으십시오. <table border="1" data-bbox="178 1930 1391 2020"> <thead> <tr> <th>증상의 명칭</th> <th>증상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>쇼크(아나필락시)</td> <td>사용 후 바로 피부의 가려움증, 두드러기, 목이 쉼, 재채기, 목 간지러움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.</td> </tr> </tbody> </table>		증상의 명칭	증상	쇼크(아나필락시)	사용 후 바로 피부의 가려움증, 두드러기, 목이 쉼, 재채기, 목 간지러움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.																
증상의 명칭	증상																				
쇼크(아나필락시)	사용 후 바로 피부의 가려움증, 두드러기, 목이 쉼, 재채기, 목 간지러움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.																				
3. 1주일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.																					