

名稱 Zenol密合貼布

特徵

第3類醫藥品

●外用鎮痛消炎藥

1.「消炎效果與冷敷貼布效果相當有用」水楊酸二乙酯的消炎效果與高含水基劑的冷敷貼布效果，對關節痛、肌肉痛、扭傷相當有用。

2.「伸縮性佳、密合黏貼不易脫落」採用高伸縮性的不織布與高黏著性的膏體，可密合黏貼於手肘、膝蓋等常動部位，發揮貼布的效果。

3.「鋁箔夾鍊袋包裝」便於保存的鋁箔夾鍊袋包裝，能防止貼布藥劑乾燥。



成分／份量

膏體100g中(相當於875cm²的面積)所含

成分	含量
水楊酸二乙酯	1.70g
l-薄荷醇	0.50g
維生素E醋酸酯	0.30g

添加物：明膠、丙二醇、十四酸異丙酯、吐溫80、乙二胺四乙酸鈉、對羥基苯甲酸酯、甘油、聚丙烯酸鈉部分中和物、聚丙烯酸鈉、纖維素膠、酒石酸、蓖麻油、丙二醇脂肪酸酯、聚丙烯酸澱粉、氧化鋅、氫氧化鋁

效能／效果

關節痛、肌肉痛、扭傷、肩部僵硬、肌肉疲勞、腰痛、挫傷、骨折痛、凍傷

詳細資訊

經銷商	大鵬藥品工業股份有限公司		
製造經銷商	三笠製藥股份有限公司		
劑型	藥布		
包裝單位	1盒(14cmx10cmx12片)	1盒(14cmx10cmx24片)	1盒(14cmx10cmx24片)x2盒包裝
廠商建議零售價格	1200日圓	2000日圓	4000日圓
JAN代碼	4987117372106	4987117372151	4987117372182
使用期限	3年		

用法與用量

剝除藥面膠膜後，1天1~2次黏貼於患部。

[用法／用量相關注意事項]

- (1)請嚴格遵守用法與用量。
- (2)讓兒童使用時，請家長在旁指導監督。
- (3)請先擦乾患部的汗水後再使用。

使用注意事項

☒ 禁止事項

(若不遵守將會使目前症狀惡化，容易引發副作用。)

請勿使用於以下部位。

- (1)眼睛周圍、黏膜等 (2)溼疹、皮膚乾燥部位、傷口

■ 諮詢事項

- 1.有以下情形者，使用前請先向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

曾因藥物等產生過敏症狀者

- 2.使用後出現以下症狀時，可能是產生副作用，請立刻停止使用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	起疹／發紅、發癢

- 3.使用5~6天後症狀仍未改善時，請停止使用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。